

SCAPURA nieuwsbrief

Juli 2017

Beste mede-onderzoekers

Er zijn op dit moment 113 patiënten in de studie opgenomen. Hiervan zijn 28 in het exclusielog. De overige 85 zijn geïncludeerde patiënten, dus waardevol voor deze onderzoeksvraag. Wij hopen echter dat we bij een aantal van 200 patiënten voldoende materiaal hebben om een uitspraak te doen over de (on)betrouwbaarheid van de bipten bij het opsporen van achtergebleven tumor. Hoewel de indruk bestaat dat de bipten niet alles oppikken, kunnen ze toch van nut zijn.

Stel dat bijv. na 200 patiënten met negatieve bipten er toch 5 zijn met tumorrest, dan is de kans op tumorrest bij negatieve bipten 2,5 (95% CI 0,5-4,5%). Als het operatiesico hoger is – wat bij veel oude mensen al snel het geval is, kan veilig gekozen worden voor controle als de bipten geen resttumor tonen.

Het issue van onzekere lokale radicaliteit van een endoscopisch verwijderde poliep komt vooral voor bij het onverwacht aantreffen van carcinoom. Dit komt, ondanks alle pogingen om dit van te voren te herkennen, toch voor. We vragen u alert te zijn op deze patiënten, vooral als ze aanvullend geopereerd worden. Neem bipten van het litteken en er is een waardevolle bijdrage aan het onderzoek gerealiseerd.

